

# LØSNINGSFORSLAG TIL OBLIG 2 FOR MA 001

## OPPGAVE 1

- (a) Blandingstemperaturen blir  $T_b = (150 \cdot 68 + 10 \cdot 4)/(150 + 10) = 64^\circ\text{C}$ .
- (b)  $T(0) = T_r + (T_0 - T_r) \cdot 1 = T_0$  så  $T_0$  er temperaturen etter 0 minutter. Vi har  $(1/2)^{(t+h)/h} = (1/2) \cdot (1/2)^{t/h}$ , så  $T(t+h) - T_r = (1/2)(T(t) - T_r)$ , dvs.  $h$  er halveringstiden for differansen mellom temperaturen i kaffen og romtemperaturen.
- (c) Setter inn  $T_0 = 64$ ,  $T_r = 20$ ,  $t = 10$  og  $T(10) = 42$  og får  $42 = 20 + (64 - 20)(1/2)^{10/h}$ , som gir  $(1/2)^{10/h} = (42 - 20)/(64 - 20) = 22/44 = 1/2$ . Så  $10/h = 1$  og  $h = 10$  minutter.

Etter  $t = 20$  minutter er temperaturen  $T(20) = 20 + (64 - 20)(1/2)^{20/10} = 20 + 44(1/2)^2 = 31^\circ\text{C}$ .

(d) Setter inn  $T_0 = 68$  (uten melk),  $T_r = 20$ ,  $t = 20$  og  $h = 10$  og får at temperaturen er  $T(20) = 20 + (68 - 20)(1/2)^{20/10} = 20 + 48(1/2)^2 = 32^\circ\text{C}$ .

(e) Blandingstemperaturen er  $T_b = (150 \cdot 32 + 10 \cdot 4)/(150 + 10) = 4840/160 = 30.25^\circ\text{C}$ . Etter 20 minutter er derfor student A's kopp kaffe med melk varmest.

## OPPGAVE 2

- (a) Deriverer  $F(t)$  med hensyn på  $t$  og får  $F'(t) = -(a/k) \cdot 1 \cdot e^{-kt} - (a/k) \cdot t \cdot (-ke^{-kt}) - (a/k^2)(-ke^{-kt}) - (b/\ell)(-\ell e^{-\ell t}) = ate^{-kt} + be^{-\ell t} = f(t)$ . Altså er  $F(t)$  en antiderivert til  $f(t)$ .

(b) Setter inn og får  $f(0) = 2.0 \cdot 10^5 \cdot 0 \cdot e^{-1.0 \cdot 0} + 2.0 \cdot 10^4 \cdot e^{-0.1 \cdot 0} = 0 + 2.0 \cdot 10^4 \cdot 1 = 2.0 \cdot 10^4$ .

I grensen er  $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = a \lim_{t \rightarrow \infty} t(e^{-k})^t + b \lim_{t \rightarrow \infty} (e^{-\ell})^t = a \cdot 0 + b \cdot 0 = 0$ .

(c)  $V(t)$  er en antiderivert til  $f(t)$ , så  $V(t) = F(t) + C$  for en konstant  $C$ . Siden  $V(0) = 0$  må  $C = -F(0) = (a/k) \cdot 0 \cdot e^{-k \cdot 0} + (a/k^2) \cdot e^{-k \cdot 0} + (b/\ell)e^{-\ell \cdot 0} = 0 + (a/k^2) + (b/\ell) = 2.0 \cdot 10^5 / 1.0^2 + 2.0 \cdot 10^4 / 0.1 = 4.0 \cdot 10^5$ . Dette gir

$$\begin{aligned} V(t) &= (a/k^2) + (b/\ell) - (a/k)te^{-kt} - (a/k^2)e^{-kt} - (b/\ell)e^{-\ell t} \\ &= 4.0 \cdot 10^5 - 2.0 \cdot 10^5 te^{-1.0t} - 2.0 \cdot 10^5 e^{-1.0t} - 2.0 \cdot 10^5 e^{-0.1t}. \end{aligned}$$

(d) Har valgt  $C$  slik at  $V(0) = 0$ .

I grensen er

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) &= (a/k^2) + (b/\ell) - (a/k) \lim_{t \rightarrow \infty} te^{-kt} - (a/k^2) \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-kt} - (b/\ell) \lim_{t \rightarrow \infty} e^{-\ell t} \\ &= (a/k^2) + (b/\ell) - 0 - 0 - 0 = (a/k^2) + (b/\ell) = 4.0 \cdot 10^5. \end{aligned}$$

(e)  $V'(t) = f(t) > 0$  så  $V$  er strengt voksende. Etter  $t = 20$  timer er derfor  $V(20) < \lim_{t \rightarrow \infty} V(t) = 4.0 \cdot 10^5$ . Etter  $t$  timer er det tappet ut  $ct \text{ m}^3$  vann, så etter 20 timer er det tappet ut  $2.0 \cdot 10^4 \cdot 20 = 4.0 \cdot 10^5 \text{ m}^3$  vann. Dette er mer enn  $V(20)$ , så reservoaret er tømt innen 20 timer.

## OPPGAVE 3

(a) Regner ut

$$\begin{aligned} f_t(x) &= 4 \cos x + 3 \cos(x-t) \\ &= 4 \cos x + 3 \cos x \cos t + 3 \sin x \sin t \\ &= (4 + 3 \cos t) \cos x + (3 \sin t) \sin x . \end{aligned}$$

Her er  $(4 + 3 \cos t) \cos x + (3 \sin t) \sin x = C \cos(x - x_0)$  når  $(C, x_0)$  er polarkoordinatene til  $(4+3 \cos t, 3 \sin t)$ . Så  $C \geq 0$  oppfyller  $C^2 = (4+3 \cos t)^2 + (3 \sin t)^2 = 16 + 24 \cos t + 9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t = 16 + 24 \cos t + 9 = 25 + 24 \cos t$ , dvs.  $C = \sqrt{25 + 24 \cos t}$ . Videre må  $\tan x_0 = (3 \sin t)/(4 + 3 \cos t)$ .

(b) Deriverer ved brøkregelen

$$\begin{aligned} g'(t) &= \frac{(3 \cos t)(4 + 3 \cos t) - (3 \sin t)(0 - 3 \sin t)}{(4 + 3 \cos t)^2} \\ &= \frac{12 \cos t + 9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t}{(4 + 3 \cos t)^2} = \frac{3(4 \cos t + 3)}{(4 + 3 \cos t)^2} . \end{aligned}$$

Nevneren er alltid positiv, så  $g'(t)$  har samme fortegn som  $h(t) = 4 \cos t + 3$ . Her er  $4 \cos t + 3 = 0$  hvis  $\cos t = -3/4$ , dvs. for  $t = \cos^{-1}(-3/4) = \pi - \cos^{-1}(3/4) \approx 2.419$ . Siden  $\cos t$  er strengt avtagende for  $0 \leq t \leq \pi$  er  $g'(t) > 0$  for  $0 \leq t < \cos^{-1}(-3/4)$  og  $g'(t) < 0$  for  $\cos^{-1}(-3/4) < t \leq \pi$ . Derfor er  $g(t)$  voksende på intervallet  $[0, \cos^{-1}(-3/4)]$  og avtagende på intervallet  $[\cos^{-1}(-3/4), \pi]$ .

(c)  $g(t)$  har maksimum for  $t = \cos^{-1}(-3/4)$ , der  $g$  skifter fra å være voksende til å være avtagende. Her er  $\sin t = +\sqrt{1 - \cos^2 t} = \sqrt{1 - (-3/4)^2} = \sqrt{7}/4$ . Maksimumsverdien er  $g(t) = 3 \sin t / (4 + 3 \cos t) = (3\sqrt{7}/4) / (4 + 3(-3/4)) = 3\sqrt{7}/(16 - 9) = 3\sqrt{7}/7 \approx 1.134$ .

(d) For  $t = \cos^{-1}(-3/4)$  er  $g(t)$  maksimal. Fra (a) finner vi  $C = \sqrt{25 + 24 \cos t} = \sqrt{25 + 24(-3/4)} = \sqrt{7} \approx 2.646$  og  $\tan x_0 = g(t) = 3\sqrt{7}/7$ , så  $x_0 = \tan^{-1}(3\sqrt{7}/7) \approx 0.848$ . Koordinatene er  $(\tan^{-1}(3\sqrt{7}/7), \sqrt{7})$ .

## OPPGAVE 4

(a) Gitt  $5 = c \cdot 4^r$  og  $2 = c \cdot 25^r$  fås  $5/2 = (c \cdot 4^r) / (c \cdot 25^r) = (4/25)^r$ , dvs.  $\log(5/2) = r \log(4/25)$  eller  $r = \log(5/2) / \log(4/25) = -1/2$ . Da er  $c = 5/4^{(-1/2)} = 5/(1/2) = 10$ . Vi har  $\log y = \log c + r \log x$  så  $\log y$  er en lineær funksjon av  $\log x$  og grafen til  $y$  som funksjon av  $x$  blir en rett linje i et dobbeltlogaritmisk koordinatsystem, men ikke i et rettvinklet lineært eller et enkeltlogaritmisk koordinatsystem.

(b)

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2h}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0 + 2 \sin 2h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4 \cos 2h}{2} = 2 \cos 0 = 2 .$$

(c) Det ubestemte integralet er

$$\int \sin^4 x \cos x \, dx = \int g(x)^4 g'(x) \, dx = \int u^4 \, du = (1/5)u^5 + C = (1/5) \sin^5 x + C .$$

Så

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^4 x \cos x \, dx = [(1/5) \sin^5 x]_{-\pi/2}^{\pi/2} = (1/5)1^5 - (1/5)(-1)^5 = 2/5 .$$